

- ※ 의약품은 사용하시기 전에 주의깊게 읽도록 하시고 설명서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
 ※ 의약품을 처방된 증상·환자 이외에는 사용하지 말고, 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

치질약 선택의 새로운 기준

나노디오^정 600mg (디오스민)

일반의약품

치질로 인한

통증·출혈·돌출 개선



치질과 관련된
징후의 치료



정맥부전
다리 중압감, 통증

원료약품 및 그 분량 1정(970mg) 중

유효성분

• 디오스민(EP) 600mg

첨가제

• 첨가제(타르색소) : 황색203호(퀴놀린엘로우WS), 청색1호
(브릴리안트블루 FCF)

• 기타 첨가제 : 경질무수구산, 경화유, 미결정셀룰로오스,
수산화마그네슘, 수산화칼륨, 스테아르산마그네슘, 염화
칼륨, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 침강탄산칼슘,
탄실드녹색(19G598), 폴리에틸렌글리콜6000

성상 : 연두색의 원형 필름코팅정제

효능·효과 :

1. 치질과 관련된 징후의 치료
2. 정맥부전과 관련된 증상의 개선 : 다리 중압감, 통증
3. 모세혈관 취약증에 의한 장애의 보조치료

용법·용량

- 치질 : 디오스민으로서 1회 600mg 1일 2~3회(1,200~1,800mg) 식사 시 복용
- 정맥 부전 : 디오스민으로서 1회 600mg 1일 1회 (매일 아침 식전에) 복용

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 1) 이 약 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 수유부
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 임부(필요한 경우에만 이 약 투여가 고려되어야 한다.)
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것
이 약 투여 후 소화장애가 나타날 수 있으나, 치료를 중단하는 경우는 드물다.
4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
이 약을 투약해도 다른 항문 질환에 대한 특별한 치료법이 면제되지 않는다. 이 약은 오랜 기간 투약하지 말아야 한다. 증상이 빨리 나아지지 않으면, 항문검사를 실시해야 하며 치료를 재검토해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

저장방법 :

밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

포장단위 :

60정/상자(30정/병x2), 30정/병, 60정/상자(10정/PTP)x6
20정/상자(10정/PTPx2)

사용기간 :

제조일로부터 36개월

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한(유효기간)이 경과되었거나, 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 의약품의 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품 의약품안전처 의약품통합정보시스템 (nedrug.mfds.go.kr)을 참조하세요.

※ 내용 외 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품 안전처로 연락하시고, 부작용 보고 및 피해구제 제도 신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223) 및 피해구제 제도 전용 상담번호(14-3330)에서 할 수 있습니다.

※ 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 www.chodang.com 또는 전화 02-2206-3800에서 확인 할 수 있습니다.

소비자 상담전화 : 080-302-3000 (수신자 부담)

제조판매자 : 초당약품공업(주) 경기도 안산시 단원구 별망로 381

문서작성년월일 : 2021. 09. 27 최종개정년월일 : 2024. 01. 04