

일반의약품

비타민D(콜레칼시페롤) 1,000IU + 칼슘시트레이트말레이트 468mg (칼슘 100mg)

칼시마정

- ※ 의약품을 사용하시기 전에 주의깊게 읽도록 하고 설명서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- ※ 의약품을 처방된 증상·환자 이외에는 사용하지 말고, 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

비타민D(콜레칼시페롤) 1,000IU + 칼슘시트레이트말레이트 468mg(칼슘 100mg)

칼시마정

조제용 | 일반의약품



칼시마정은 비타민D와 칼슘의 보급을 위하여 1일 비타민D(콜레칼시페롤) 1,000IU와 칼슘 100mg를 복용하도록 설계된 복합 의약품입니다.

[원료약품의 분량] 1정 중

- 유효성분 : 칼슘시트레이트말레이트(USP) 468mg(칼슘으로서 100mg)
 농축콜레칼시페롤(분말형)(EP) 10mg(콜레칼시페롤로서 1,000IU)
- 첨가제(타르색소) : 적색40호(알루미늄염 AC 알루미늄레이크), 청색1호(브릴리안트블루 FCF 알루미늄레이크), 황색203호(퀴놀린옐로우 WS 알루미늄레이크)
- 동물유래성분 : 농축콜레칼시페롤(분말형) (소, 젤라틴)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스카멜로오스나트륨, 탭실드녹색21G025

[성상]

연녹색의 정방형 필름코팅정

[효능·효과]

- 다음 경우의 비타민D의 보급
 - 임신·수유기, 발육기, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능효과는 다음과 같다.
 - 뼈, 이의 발육발량
 - 구루병의 예방

[용법·용량]

만 8세 이상 및 성인 : 1일 1회 1정을 복용(사용)

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - (1) 고칼슘혈증(hypercalcemia) : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태 환자, 유육종증(sarcoidosis) : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환, 신장질환 환자
 - (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - (3) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - (4) 신장결석 환자
 - (5) 심한 증상의 신부전 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - (1) 만 1세 미만의 젖먹이
 - (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - (3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
 - (4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 비타민D는 모유로 분비되어 산생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
 - (5) 심장 순환기계기능 장애 환자
 - (6) 신장장애 환자
 - (7) 저단백혈증 환자
 - (8) 강심배당체를 투여 중인 환자
 - (9) 신장결석 병력이 있는 환자

- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진
 - (2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - (3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
 - (4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용 투여 시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
 - (5) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - (6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - (1) 정해진 용법 용량을 잘 지킬 것.
 - (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것.
 - (3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관 할 것.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지말 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30° C)보관

[포장단위] 90정/병, 90정/피티피(10정/PTPX9), 30정/병

-
- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한(유효기한)이 경과되었거나 변질 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
 - ※ 이 첨부 문서 작성일자 이후 변경된 내용은 www.chodang.com 또는 전화 02-2206-3800에서 확인할 수 있습니다.
 - ※ 내용의 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처로 연락하시고, 부작용 보고 및 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223) 및 피해구제 제도 전용 상담번호(14-3330)에서 할 수 있습니다.
 - ※ 의약품 용어 설명 및 정보는 의약품 통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr) 의약품 정보 참조
 - ※ 소비자상담전화번호 : 080-302-3000(수신자부담)

문서작성년월일 : 2021. 11. 01
문서개정년월일 : 2023. 10. 31

[제조판매자]

초당약품공업(주)

경기도 안산시 단원구 별방로 381