

5
분이면
이!

기능성화장품

새치커버전용 벨로오분 크림

사용설명서 공용

염색하기 전

- 염색하기 전에 반드시 설명서를 끝까지 읽어주십시오.
- 염색 전에 반드시 삼투할 필요는 없습니다. 단, 헤어 스타일링제를 많이 사용한 경우, 트리트먼트 제품을 사용했을 경우, 모발이 심하게 더러워 졌을 경우에는 두피에 상처가 나지 않도록 가볍게 삼푸하시고 잘 말린 후 염색 하십시오.
- 개인에 따라 알레르기가 나타날 우려도 있으므로 사용 전에 반드시 피부시험(패치테스트, Patch test)를 하시기 바랍니다.
- 파마는 염색하기 일주일 이전에 해주십시오.

새치커버전용 벨로오분 크림

특장점

- ▶ 5분이면 원하는 자연스러운 색상을 낼 수 있습니다.
- ▶ 헤어 트리트먼트 성분이 배합되어 염색 후 부드럽고 윤기 있는 모발을 유지시켜 줍니다.
- ▶ 암모니아 성분이 함유되지 않아 자극적인 냄새가 거의 없습니다.
- ▶ 투브식 크림타입으로 모발의 부분염색이 가능하며 혼자서도 손 쉽게 염색할 수 있습니다.

최종개정년월일: 2018. 01. 10

제조업자

(주)세화피앤씨

충청북도 진천군 초평면 은암길 36

제조판매업자

초당약품공업(주)

경기도 안산시 단원구 별망로 381

염색시 참고사항

- 1. 염색하기 전 반드시 머리를 감을 필요는 없지만, 다음의 경우에는 머리를 감고 완전히 말린 후 염색을 하여야 더 좋은 염색결과를 얻을 수 있습니다.
(이때 린스를 함유하지 않은 삼푸로 머리를 감아 주십시오.)
- 2. 헤어 스타일링제(헤어로션, 크림, 헤어스프레이, 헤어오일)를 많이 사용한 경우
- 3. 트리트먼트 제품을 사용했을 경우
- 4. 모발이 심하게 더러워 졌을 경우
- 5. 지성 모발인 경우
- 6. 평소 염색시 염색액은 모발(굵고 단단한 모발, 지성인 모발, 손상된 모발)은 염색액을 충분히 도포하고 염색 시간을 표준시간보다 수 분간 연장합니다.
- 7. 파마와 염색을 동시에 하거나 할 경우는 파마를 먼저 하고 염색 하십시오.
- 8. 염색 직후에는 산성샴푸를 사용하지 말고 비누 또는 악탈칼리(일반)샴푸를 사용하여 주십시오.
- 9. 염색 실내온도는 20~25°C가 적당합니다.
- 10. 여성의 경우 생리 시 염색을 피하여 주십시오.
- 11. 벨로오분의 1제 및 2제를 다른 제품과 혼용하여 사용하지 마십시오.

내용물

- ① 제1제 염모제(60g), 제2제 산화제(60g)
- ② 빗
- ③ 염색 장갑
- ④ 염색 가운
- ⑤ 혼합용기
- ⑥ 헤어트리트먼트



- ▶ 백모의 정도나 염색시간, 모발상태에 따라 다소 색상의 차이가 있을 수 있습니다.
- ▶ 새치, 백모용으로 검은머리가 밝게 염색되는 않습니다.

효능·효과

- ▶ 벨로오분크림 2호흑갈색 모발의 염모(흑갈색)
- ▶ 벨로오분크림 3호진한갈색 모발의 염모(진한갈색)
- ▶ 벨로오분크림 4호진한밤색 모발의 염모(진한밤색)
- ▶ 벨로오분크림 5호자연밤색 모발의 염모(자연밤색)

용법·용량

- 1. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것
- 2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것
- 3. 보관 및 취급시의 주의사항
가. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
나. 직사광선을 피해서 보관할 것
- 4. 눈에 접촉을 피하고 눈에 들어갔을 때는 즉시 씻어낼 것
- 5. 염모제산화염모제와 신화염모제

- 6. 다른 분들은 사용하지 마십시오. 사용 후 피부나 신체가 과민상태로 되거나 피부이상 반응(부종, 염증 등)이 일어나거나, 현재의 증상이 악화될 가능성이 있습니다.
- 7. (1) 지금까지 이 제품에 배합되어 있는 「과황산염」이 험화된 탈색제로 물이 부은 경험이 있는 경우, 사용 중 또는 사용 직후에 구역, 구토 등 속이 좋지 않았던 분(이 내용은 「과황산염」이 배합된 염모제에만 표시한다)
- 8. (2) 지금까지 염모제를 사용할 때 피부이상반응(부종, 염증 등)이 있었거나, 염색 중 또는 염색 직후에 발진, 발적, 가려움 등이 있거나 구역, 구토 등 속이 좋지 않았던 경험이 있었던 분
- 9. (3) 피부시험(패치테스트, patch test)의 결과, 이상이 발생한 경험이 있는 분
- 10. (4) 두피, 얼굴, 목덜미에 부스럼, 상처, 피부병이 있는 분
- 11. (5) 생리 중, 임신 중 또는 임신할 가능성이 있는 분
- 12. (6) 출산 후 병증, 병약, 복부, 종인 분, 그 밖의 신체에 이상이 있는 분
- 13. (7) 특이체질, 신장질환, 혈액질환이 있는 분
- 14. (8) 미열, 관대감, 두근거림, 호흡곤란의 증상이 지속되거나 코피 등의 출혈이 찾고 생리, 그 밖에 출혈이 멈추기 어려운 증상이 있는 분
- 15. (9) 이 제품에 경기제로 험화된 프로필렌글리콜에 의하여 알레르기를 일으킬 수 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 반응을 보였던 적이 있는 분은 사용 전에 의사 또는 약사와 상의하여 주십시오(프로필렌글리콜 함유 제제에만 표시한다)

나) 염모제 사용 전의 주의

- 1. 염색 전 2일정(48시간 전)에는 다음의 순서에 따라 매회 반드시 패취테스트(patch test)를 실시하여 주십시오. 패취테스트는 염모제에 부작용이 있는 체질인지 아닌지를 조사하는 테스트입니다. 과거에 아무 이상이 없이 염색한 경우에도 체질의 변화에 따라 알레르기 등 부작용이 발생할 수 있으므로 매회 반드시 실시하여 주십시오.
(패취테스트의 순서 ① ~ ④를 그림 등을 사용하여 알기 쉽게 표시하며, 필요 시 사용 상의 주의사항에 「별첨」으로 첨부할 수 있음)

- 2. 제1제: 제2제 = 1:1
3. 팔 안쪽
4. 귀 뒷쪽
5. 헤어트리트먼트

저장방법 및 사용기간

기밀용기, 실온보관(1~30°C), 제조일로부터 36개월

1 같은 양의 제1제 염모제와 제2제 산화제를 플라스틱 용기에 짠 후 염색용 솔로 잘 혼합합니다.



- ▶ 제1제 투브는 뚜껑의 뾰족한 부분을 이용하여 투브에 구멍을 뚫습니다.
- ▶ 제2제 투브는 뚜껑의 뾰족한 부분을 이용하여 투브에 구멍을 뚫습니다.
- ▶ 다시 사용할 수 있도록 염모제의 뚜껑을 잘 닫아 놓으시기 바랍니다.
- ▶ 내장된 염모용 브러쉬를 사용하시면 편리합니다.
- ▶ 재 사용시 투브 앞부분의 색상이 변할 수 있으나 효과에는 영향을 주지 않으므로 안심하고 사용하시기 바랍니다.

2 모발에 바른 후 모발 위에서 잘 섞이도록 염모용 솔과 빗으로 골고루 빗어 주십시오.



- ▶ 바르는 순서는 새치·백모가 많이 난 부분부터 바릅니다.
- ▶ 모근 주변이나 깊은 빗으로 염색이 잘 되지 않는 부분은 염모용 빗 반대편 솔로 두피에 자극이 없도록 조심해서 발라 주십시오.
- ▶ 전체적인 도포가 끝나면 헤어라인 구역(나루 부분, 흰머리가 많은 부분은 한번 더 염색약을 발라주십시오).

3 바른 후 5~10분을 기다립니다.



- ▶ 굵고 질긴 모발, 백모가 많은 모발, 실내 온도가 20~25°C 보다 낮은 경우는 염색 시간을 수 분간 연장하는 것이 좋습니다.
- ▶ 혼합크림이 덜 발라진 부분이 있으면 혼합크림을 더 발라주는 것이 좋습니다. 혼합크림 도포 후 방치시간이 길수록 더욱 진하게 염색됩니다.

4 샴푸로 머리를 감고 잘 헹구어 줍니다.



- ▶ 염색액이 눈에 들어가지 않도록 주의하십시오.
- ▶ 혼합크림이 피부에 묻었을 경우에는 비누를 사용하여 지우십시오.

- ① 먼저 팔의 안쪽 또는 귀 뒤쪽 머리카락이 난 주변의 피부를 비누물로 잘 씻고 탈지면으로 가볍게 닦습니다.
- ② 다음에 이 제품 소량을 취해 정해진 용법대로 혼합하여 실험액을 준비합니다.
- ③ 실험액을 양서 세척한 부위에 동전 크기로 바르고 자연건조시킨 후 그대로 48시간 방치합니다.(시간은 잘 자помн니다)
- ④ 테스트 부위의 관찰은 테스트액을 바른 후 30분 그리고 48시간 후 총 2회를 반드시 행하여 주십시오. 그 때 도포 부위에 발진, 발적, 가려움, 수포, 자극 등의 피부 등의 이상이 있는 경우에는 손 등으로 만지지 말고 바로 씻어내고 염모는 하지 말아 주십시오. 테스트 도포, 48시간 이전이라도 위와 같은 피부이상을 느낀 경우에는 바로 테스트를 중지하고 테스트액을 씻어내고 염모는 하지 말아 주십시오.
- ⑤ 48시간 이내에 이상이 발생하지 있다면 바로 염모하여 주십시오.
- ⑥ 눈썹, 속눈썹 등을 위험으로 사용하여 마십시오. 염모액이 눈에 들어갈 염려가 있습니다. 그 밖에 두발 이외에는 염색하지 말아 주십시오.
- ⑦ 면도 직후에는 염색하지 말아 주십시오.
- ⑧ 면도 전후 주간은 파마·웨이브(파마너트웨이브)를 하지 말아 주십시오.
- ⑨ 염모 시의 주의
(1) 염모 또는 머리를 감는 동안 그 액이 눈에 들어가지 않도록 하여 주십시오. 눈에 들어가면 심한 통증을 발생시키거나 경우에 따라서 눈에 손상각막의 염증을 일 수 있습니다. 만일 눈에 들어갔을 때는 절대로 손으로 비비지 말고 바로 물 또는 미지근한 물로 15분 이상 잘 씻어 주시고 곧바로 안과 전문의의 진찰을 받으십시오. 임의로 약을 사용하지 마십시오.
- (2) 염색 후에는 목욕을 하거나 염색 전에 머리를 적시거나 감자 말아 주십시오. 땀이나 물방울 등을 통해 염모액이 눈에 들어갈 염려가 있습니다.
- (3) 염모 중에 발진, 발적, 부어오름, 가려움, 강한 자극감 등의 피부이상이나 구역, 구토 등의 이상을 느꼈을 때는 즉시 염색을 중지하고 염모액을 잘 씻어내 주십시오. 그대로 방치하면 증상이 악화될 수 있습니다.
- (4) 염모액이 피부에 묻었을 때는 곧바로 물 등으로 씻어내 주십시오. 손가락이나 손톱을 보호하기 위하여 장갑을 끼고 염색하여 주십시오.
- (5) 흙이 잘 되는 곳에서 염모하여 주십시오.
- ⑩ 염모 후의 주의
(1) 머리, 얼굴, 목덜미 등에 발진, 발적, 가려움, 수포, 자극 등 피부의 이상반응이 발생한 경우, 그 부위를 손으로 긁거나 문지르지 말고 바로 피부과 전문의의 진찰을 받으십시오. 임의로 의약품 등을 사용하는 것은 삼가 주십시오.
- (2) 염모 중 또는 염모 후에 속이 안 좋아지는 등 신체이상을 느끼는 분은 의사에게 상담하십시오.
- ⑪ 보관 및 취급상의 주의
(1) 혼합한 염모액을 밀폐된 용기에 보관하지 말아 주십시오. 혼합한 액으로부터 발생하는 가스의 압력으로 용기가 파손될 염려가 있어 위험합니다. 또한 혼합한 염모액이 위로 튀어 오르거나 주변을 오염시키고 지워지지 않게 됩니다. 혼합한 액의 잔액은 효과가 없으므로 잔액은 반드시 비벼 버려 주십시오.
- (2) 용기를 비울 때는 반드시 끝을 열어서 비벼 주십시오.
- (3) 사용 후 혼합하지 않은 액은 치사광선을 피하고 공기와 접촉을 피하여 서늘한 곳에 보관하여 주십시오.